




American Veterinary Society
of Animal Behavior

www.AVSABonline.org

דף העמדה של ארגון הוטרינרים האמריקאים AVSAB ביחס לחיבורות וחשיפת גורים צעירים מחוץ לבית



עמדתו של ארגון הוטרינרים האמריקנים תומכת חד משמעית בהתחלת תהליך החשיפה והחיבורות לפני השלמת סידרת החיסונים.

בשלושת החודשים הראשונים בחיי הגור הפתיחות והמוכנות לחיבורות גוברים על פחד. זה חלון הזדמנויות מצוין עבור

הגור להכיל ולאמץ אל עולמו אנשים, בעלי וחיים והתנסויות מגוונות. תהליך חיבורות שלא הושלם או שנעשה באופן לא מתאים לגור, מגביר את הסיכון ביצירת

**מסיבה זו, ארגון הוטרינרים
האמריקאים AVSAB
מאמין כי החשיפה והחיבורות
צריכים להתחיל בטרם סיימו את
כל תהליך החיסונים.**

**הזמן הקריטי בחיי גור לחשיפה הוא
בשלושת החודשים הראשונים לחייו.**
במהלך תקופה זו יש לחשוף את הגור למספר

רב ככל הניתן של גרועים: בני אדם, כלבים אחרים ובעלי חיים בכלל, אזורי מחיה וטבע. כל זאת תוך תהליך של התבוננות והתאמה

לתגובות הגור על מנת להימנע מחשיפה מוגזמת, מסכנת ולא מבוקרת, שתגרום את התוצאה ההפוכה מהמקווה. יש לשים לב לתגובות המעידות על פחד כמו נביחות, התעלמות או רעד והתכנסות.

בעיות התנהגות עתידיות כמו פחד, התעלמות ו/או תוקפנות.

בעיות התנהגות הן האיום הגדול ביותר על הקשר בין כלב לבעליו.

למעשה בעיות התנהגות הן הגורם הראשון ברשימת הגורמים לנטישה וסיום חיי הכלבים בהסגרים.

בניגוד למקובל לחשוב בעיות התנהגותיות, ולא מחלות זיהומיות, הן הגורם מספר אחת למות כלבים עד גיל שלוש.

בחודשים מוקדמים אלה מערכת החיסון המתפתחת של הגור, נתמכת ע"י השילוב של

נוגדנים מחלב אמו, חיסונים ראשוניים ותשומת לב מוקפדת לגבי אזורי חשיפה וכך הלאה. גורמים אלה מקטינים מאד את הסיכון למוות ממחלה זיהומית לעומת הסיכון של מוות כתולדה של בעיית התנהגות.

וטרינרים מומחים בהתנהגות, ממליצים בכל פה לבעלי כלבים, לנצל כל הזדמנות בטוחה על מנת לחשוף את הגור הצעיר למגוון העצום של גרויים אליהם יש סיכוי שהכלב ייחשף במהלך המשך חייו.

באופן כללי, גורים צריכים לקבל את סט החיסונים הראשון לכחות שבוע לפני יציאה או טיול ראשון בחוץ.

כדאי להתחיל לצאת לטיולים בטווח גילאי 7-8 שבועות. אין לדלג על חיסוני המשך במהלך טיולים מחוץ לבית.